

Termesztési útmutató süngomba blokk letermesztéséhez

A süngomba alapanyag átszövetett formában, termesztésre készen kerül forgalomba. A vásárlónak nincs más dolga, mint az útmutató alapján letermeszteni a megvásárolt blokkot. Ha vásárláskor a blokk fehér színű, a védőréteg kialakulása miatt az idővel be fog barnulni. Az elszíneződés tehát természetes!

1. lépés: Mivel a süngomba a teljes átszövődés előtt már termőtesteket képez az alapanyag felszínén, a teljes átszövődést az jelzi, amikor az alapanyag felületét elborítják a termőképletek, és az anyag állaga rugalmas.

2. lépés: Termőre fordítás: A kifehéredett blokkokat az átszövődés helyén természetjük le. A termőre forduláshoz szükség van egy kis természetes vagy mesterséges fényre is, néhány fokos hőmérséklet csökkentésre (10-16 °C) és több páratartalomra. a zsákokon kis rést nyitunk, melyen át a gomba oxigénhez jut, és néhány nap múlva termőtesteket képez. A zsák eredeti nyílását, melyen át az átszövődés során szűrt, csökkentett mennyiségű levegőhöz jutott, teljesen lezárjuk, és a zsák (blokk) egy más pontján hozunk létre max. 1 cm átmérőjű nyílást (nyílásokat). Ezzel megakadályozzuk a szabálytalan vegetatív szaporítóképletek további növekedését.

A gomba, növekedése alatt 18-24 °C –t igényel! A süngomba termőtestképzése folyamatos, a termőtest növekedése akár 2 hétig is tarthat, s eközben bármikor szedhető. A teljesen érett termőtest hófehér, kompakt állagú, öregedését sárgásbarna elszíneződése jelzi. A blokk 3-4 termőhullámban terem. Utána az anyag felpuhul, és már csak apró termőtestek fejlődnek, ekkor a blokkot cserélni kell. Az első terméshullámot követően két héttel a blokkot víz alá merítjük fél órára. Ugyanígy járunk el a többi hullám után is.

Figyelem! A gomba termőtest képződéséhez fény kell (természetes, vagy mesterséges szórt fény), napi 8-10 órás megvilágítás! A huzat mindenáron elkerülendő, de a természetőhelyiség levegőztetésére azonban szükség van!

3. lépés: A termés: A süngomba tetszetős fehér színét 4-10 °C on tárolva 2-3 napig megőrzi, másképp megsárgul. Mivel termőhullámai elnyújtottak, célszerű közvetlenül a felhasználáskor szedni. Könnyen szárad, szárítmánya megőrzi fehér színét.

Figyelem! Leszedéskor vigyázni kell, hogy tönkmaradvány a blokkokon ne maradjon, mert ez minden betegség melegágya. A szedés után a blokkon maradt tönkcsonkot a blokkig teljesen vissza kell vágni!

Leggyakoribb termesztési hibák:

- Túl magas páratartalom vagy levegőtlenység jele: penészesedés, gomba lepuhulása
A páratartalmat csökkenteni kell. A blokkot ilyenkor ritkábban kell permetezni. A penészbevonatot késsel le lehet kaparni. Levegőcserét (nem huzatot!) biztosítani kell.
- Túl sok öntözés következménye lehet, hogy a termőtesteken baktériumfoltok (sötét, feketés színű kis foltok) alakulnak ki. Ilyen esetben is csökkenteni kell az öntözések számát.

A termesztéshez sok sikert és jó termést kíván a Champex Kft!