

Útmutató Süngomba blokk termesztéséhez

A termőblokk Magyarországon termesztett és gyártott alapanyagokat tartalmaz!

A süngomba alapanyag átszövetett formában, termesztésre készen kerül forgalomba. A vásárlónak nincs más dolga, mint az útmutató alapján letermeszteni a megvásárolt blokkot.

1. lépés: Mivel a süngomba a teljes átszövődés előtt már termőtesteket képez az alapanyag felszínén, a teljes átszövődést az jelzi, amikor az alapanyag felületét elborítják a termőképletek és az anyag állaga rugalmas.

2. lépés: Termőre fordítás: A kifehéredett blokkokat a letermesztésre szánt tiszta, fertőzésmentes helyiségbe helyezzük. A termőre forduláshoz szükség van egy kis természetes vagy mesterséges fényre is (direkt napfény kerülendő) és magas páratartalomra. A fólián 2-3 helyen késsel 1-2 cm-es réseket kell vágni. Ezeken a réseken fog a gomba megjelenni. Ott, ahol a fólia alatt gombakezdeményeket lát, a fóliát ugyancsak fel kell nyitni. 5 nyílásnál több azonban ne legyen a blokkon, hogy az ki ne száradhasson.

3. lépés: A süngomba növekedése alatt 13-20 °C -ot igényel! A termőtest növekedése akár 2 hétig is eltarthat. A teljesen érett termőtest hófehér, közepkemény állagú, öregedését sárgásbarna elszíneződése jelzi. A blokk kb. 3 termőhullámban terem. Az első termőhullámot követően két héttel, egy vékony kötőtűvel vagy dróttal fúrunk a blokk közepébe alulról felfelé 2 lyukat, majd a blokkot víz alá merítjük 10 percre. Ugyanígy járunk el a többi hullám után is. A letermett termőblokk lepuhul, elszíneződik, térfogata összeesik.

Figyelem! A gomba termőtest képződéséhez fény kell (természetes, vagy mesterséges szórt fény), napi 8-10 órás megvilágítás és magas páratartalom! A huzat mindenáron elkerülendő, de a termesztő helyiség levegőztetésére azonban szükség van! Szedéskor vigyázni kell, hogy tönkmaradvány a blokkokon ne maradjon, mert ez minden betegség melege. A szedés után a blokkon maradt tönkcsonkot a blokkig teljesen vissza kell vágni.

A termés: A süngomba tetszetős fehér színét 4-10 °C on tárolva 2-3 napig megőrzi, másképp megsárgul. Mivel termőhullámai elnyújtottak, célszerű közvetlenül a felhasználáskor szedni. Könnyen szárad, szárítmánya megőrzi fehér színét.



Leggyakoribb termesztési hibák

- Túl magas páratartalom vagy levegőtlenység jele: penészesedés, gomba lepuhulása. A páratartalmat csökkenteni kell. A penészbevonatot késsel le lehet kaparni. Levegőcserét (nem huzatot!) biztosítani kell.
- Nagy huzat esetén, a fehér színű gombák besárgulnak, és felszínük leszárad. A huzatot csökkenteni kell.
- Előfordulhat gombaszúnyog megjelenése. A szúnyogok ellen légypapírral védekezhet, melyet a blokkhoz a lehető legközelebb célszerű helyezni. Légypapír sok kertcentrumban és nagyáruházban kapható.